



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА


**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области
в городе Асбест и Белоярском районе»**

им. А. П. Ладыженского ул., д. 17, г. Асбест, Свердловская область, 624269
Тел./Факс: 8 (34365) 2-48-18, E-mail: mail_03@66.rosпотребнадзор.ru

Исх. №66-20-003/17-1536-2022
от 14.10.2022г.

В СМИ,
сайт Администрации ГО,
население

Осень – время вакцинации против клещевого вирусного энцефалита



Сезон активности клещей завершается, скоро членистоногие погружаются в зимнюю спячку. Часть из них погибнет, не перенеся холода, но многие успешно перезимуют и проснутся весной голодными, готовыми пить кровь и заражать.

Готовиться к новому сезону надо заранее. Октябрь – ноябрь оптимальное время для начала вакцинации. К сожалению, вакцин от всех болезней, переносимых клещами, пока не разработали, но от самой грозной болезни – клещевого энцефалита, можно и нужно защититься с помощью прививки.

Вакцинация показана всем здоровым людям и детям с 3-х лет, всем, кто любит ходить в лес, выезжает летом на дачи или гуляет в парках, планирующих выезд на эндемичные территории по клещевому вирусному энцефалиту. Профилактические прививки против данной инфекции необходимо делать заранее.

Важно понимать, что вакцинация от клещевого энцефалита не одномоментная, она растянута во времени и проводится в три приема. Начинать ее рекомендуется осенью или зимой. Необходимо завершить курс вакцинации из трех доз к началу весны (март- апрель).

Существуют стандартная и экстренная схемы вакцинации, в том и другом случае полный цикл вакцинации состоит из трех прививок, различие только во временных интервалах между ними.

При стандартной схеме вторая прививка делается в любое время, через 1-7 месяцев после первой. Третья прививка делается через 9-12 месяцев после второй — она требуется для выработки долгосрочного иммунитета (он будет защищать от инфекции в течение трех лет). Причем третья – должна быть не позднее, чем за 2 недели до выхода в очаг инфекции.

Затем, каждые 3 года проводится однократная ревакцинация, чтобы продлить иммунитет к клещевому энцефалиту.

При экстренной схеме вторая прививка делается через две недели после первой. Третья прививка, как и по стандартной схеме, проводится через 9-12 месяцев после второй.

Осень – есть возможность выбора, оптимально прививаться по стандартной, «долгой» схеме. Так будет достигнут максимальный защитный эффект. Именно по этой причине рекомендуется начинать вакцинацию от клещевого энцефалита осенью.

Если Вы ранее прививались от клещевого энцефалита, вспомните, не подошло ли время ревакцинации, и сделайте прививку в случае необходимости. Это позволит продлить защиту не менее, чем на 3 года.

Берегите себя и будьте здоровы!

Главный врач Асbestовского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

Е.В.Гилева